




## غرز او تجفيف البقرة

### تعريفه

يتم خلال مرحلة ما قبل الولادة بإنهاء الحلب على مدى شهرين (من الشهر 7 من الحمل الى الولادة التالية)



### أهميته

يوفر راحة فيزيولوجية للبقرة اين تستعيد التوازن الهرموني و البنية النسيجية للضرع.

### عمليا

يتم بصفة مباشرة تليه حماية مضادات حيوية تفاديا لالتهابات الضرع الشائعة و خلال الأسبوع الأول من الشهر 07 للحمل يتم:

- تغيير مفاجئ للعليقة: وجبة من العشب الجاف (تبن او قرط).
- تغيير مفاجئ لوتيرة الحلب: مرة واحدة في اليوم و بالتناوب اليومي حتى اليوم 08.

### المدة

الأمثل تكون على نحو 08 أسابيع. مدة التجفيف الأقل من 40 يوم والتي تفوق 90 يوم تأثران سلبيا على كميات الإنتاج للحلب الموالي.

### الحاجيات الغذائية

خلال مرحلة التجفيف تكون حاجيات القطيع تعادل حاجيات إنتاج 6-8 كغ من الحليب والتي تتناسب مع حاجيات الصيانة و الحمل.

- الصيانة: 5 وحدة علفية + 400 غ بروتين (PDI)
- الحمل: 1-3 وحدات علفية + 0-250 غ بروتين (PDI)

### توصيات عامة

- تقديم أعلاف ذات نوعية و غنية بالألياف تفاديا للمشاكل الهضمية التي تحدث بعد الولادة.
- مراقبة التغذية المعدنية و عدم الإفراط في تقديمها (الكميات المتفاوتة من الصوديوم Na و البوتاسيوم k قد تسبب في الإضطرابات الفيزيولوجية بعد الولادة.)
- تفادي الموارد العلفية الغنية بالكالسيوم (برسيم، فصة...) او بالكبريت (مخلفات عصير الشعير) للحفاظ على التوازن المعدني.

### التركيبة العلفية

- شهرين قبل الولادة: 4 كغ مركز خاص + 10 كغ سيلاج الذرة + 4 كغ تبن او قرط.
- شهر قبل الولادة: 7 كغ مركز خاص + 15 كغ سيلاج الذرة + 4 كغ تبن او قرط.