

# أهم قواعد التغذية عند البقر الحلوب



التغذية تمثل 3/4 من تكلفة إنتاج الحليب و نجاعة المنظومة العلفية و الممارسات التقنية تسمح بمراعات حاجيات القطيع بصفة أمثل و الملخصة كالآتي:

- توفير ماء الشرب بصفة تلقائية او بشكل دائم.



- عند إستبدال نوع من الغذاء يجب ان تكون عملية الإستبدال تدريجية لمدة 15 يوما و ليس بطريقة مفاجئة أي يتم إدراج كميات متزايدة من العليقة الجديدة بكميات متناقصة من العليقة السابقة (تبين او قرط او علف مركز ... الخ).

- يجب توفير الأحجار المعدنية و ملح الطعام في علائق الأبقار.



- من المستحسن طحن الحبوب (الذرة، الشعير...) لزيادة مدى الإستفادة من المواد الغذائية الموجودة في الحبوب و لعدم خروج الحبوب سليمة في روث الأبقار.



- يجب التأكد من خلو السيلاج المستعمل من التعفنات و البقايا البلاستيكية و بوجود نسبة رطوبة لا تتجاوز 65 % و إحتوائه على بعض الحبوب (على حسب نوع العلف المستعمل).

- احتواء الدريس (قرط) على أكبر كمية من الأوراق و مكون على الأقل من 80% من المادة الجافة و خالي من الأعشاب الضارة و ذو رائحة جيدة.



- يفضل إستعمال العليقة الكاملة المختلطة (Ration totale mélangée) و ذلك بخلط العلف المركز و الأعلاف الجافة (تسيير في الوقت، تقادي بعض الإضرابات الهضمية). او إستعمال خلط تبين + علف مركز + قرط في المعلف.



- في حالة تقديم العلف المركز، يجب تقسيم الحصص على حوالي 03 وجبات و التي لا تتعدى 03-04 كغ للوجبة.

